

PRÁCTICAS ACTUALES EN PREVENCIÓN DE PANCREATITIS POST-CPRE EN LATINOAMÉRICA: RESULTADOS DE UNA ENCUESTA MULTINACIONAL

<https://doi.org/10.46613/congastro2021-57>

Marino C.1, Navarrete C.2, Maluf-Filho F.3, Vargas J.4, Espino A.4. 1Fellowship de Endoscopia Avanzada, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile; 2Servicio de Cirugía Endoscópica Hospital San Borja Arriarán de Santiago. Departamento de Cirugía, Clínica Santa María. Santiago, Chile; 3Departamento de Endoscopia Gastrointestinal. Universidad de Sao Paulo. Sao Paulo, Brasil; 4Unidad de Endoscopia, Hospital UC-Christus. Departamento de Gastroenterología. Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Actualmente, no existe información respecto a las prácticas de prevención de Pancreatitis post-CPRE (PpC) en Latinoamérica. **OBJETIVO:** Describir las prácticas actuales en prevención de PpC en Latinoamérica. **MÉTODOS:** Se diseñó encuesta (Google Forms) en español y portugués basada en estudio de Avila P. et.al (GIE 2020;91:568-73). Se distribuyó vía mensajería instantánea (Whatsapp Inc.), entre grupos de endoscopistas avanzados de Latinoamérica. Se utilizó estadística descriptiva y Chi-cuadrado para variables categóricas. **RESULTADOS:** 232 respuestas de 15 países. 54,7% lleva más de 10 años realizando CPREs. 74,1% utiliza AINEs rectales. Motivos referidos para no usar AINEs: no disponibilidad (64%), no estar convencido de efecto protector (19,7%). 71,6% utiliza fluidos intravenosos. 59,1% utiliza prótesis pancreáticas como medida de prevención, la mayoría sólo en pacientes de alto riesgo. Motivos más frecuentes para no utilizar prótesis: no disponibilidad de dispositivos (26,3%), alto costo (18,7%). 59,4% utiliza precorte, 81,9% con 5 o menos intentos de canulación y 31,9% antes de 5 minutos de haberlos iniciado. Una mayor proporción de endoscopistas con mayor experiencia (> 10 años) realiza precorte antes de 5 minutos, en comparación con aquellos de menor experiencia (39,5 vs 22,6%, $p=0,028$). **CONCLUSIÓN:** AINEs rectales y fluidos intravenosos son las estrategias más utilizadas en la prevención de PpC en Latinoamérica. Mayor experiencia estaría asociada con uso precoz de precorte. Es importante protocolizar y difundir medidas para prevenir PpC en Latinoamérica.