

TL 686 CARACTERIZACIÓN DE ENFERMEDADES ESOFÁGICAS EN UN CENTRO DE DE GASTROENTEROLOGÍA EN BUCARAMANGA, COLOMBIA

<https://doi.org/10.46613/congastro2022-47>

Gualdron C¹, Ruiz Lobo E², Figueroa-Pineda C³. ¹Departamento de Medicina Interna, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. ²Profesor de Gastroenterología, Instituto de Gastroenterología y Hepatología del Oriente (IGHO), Bucaramanga, Colombia. ³Profesora de Epidemiología y metodología de la investigación, Departamento de Medicina Interna, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

Introducción: El reconocimiento de las enfermedades esofágicas es de interés para realizar un diagnóstico temprano en nuestro medio; la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) tiene una prevalencia global reportada del 10-20%, el resto de enfermedades representan la minoría de casos. **Objetivo:** Estimar la prevalencia y caracterizar las enfermedades esofágicas en pacientes atendidos en una institución de referencia en el período de 1 año. **Métodos:** Estudio de corte transversal. Pacientes >18 años con enfermedades esofágicas diagnosticadas por criterios clínicos, endoscópicos, histopatológicos, manometría esofágica de alta resolución y en casos seleccionados pH-impedanciometría. Se realizó muestreo aleatorio estratificado y sistemático con R-project 4.1.1. para los pacientes con ERGE y caracterización completa en las enfermedades menos prevalentes. **Resultados:** La prevalencia general de enfermedades esofágicas es 15,88%. 408 pacientes cumplieron criterios de inclusión. La edad promedio fue 56,5 ± 15 años, siendo 67,65% mujeres. 51,2% correspondió a ERGE erosiva (47,3% esofagitis péptica; 2,2% estenosis péptica y 1,72% esófago de Barrett). El 36% fue ERGE no erosiva. El 9,5% fueron trastornos motores esofágicos primarios: acalasia tipo 2 (3,2%) y acalasia tipo 1 (2,2%). El IMC > 29 kg/m² (OR 2,2; IC95% 1,3-3,7, p = 0,002) y hernia hiatal (OR5,61; IC 95% 3,6-8,5, p = 0,001) mostraron una asociación con esofagitis péptica. **Conclusión:** La ERGE erosiva y sus complicaciones fueron las más prevalentes. Los factores asociados a esofagitis péptica son obesidad y hernia hiatal.

