

## #21 - EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA CUÁDRUPLE CON SUBSALICILATO DE BISMUTO EN LA ERRADICACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI

<https://doi.org/10.46613/congastro2023-21>

Oviedo M<sup>1</sup>, Villegas V<sup>1</sup>, Uzcategui R<sup>1</sup>

Lugar de Trabajo

<sup>1</sup>HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. JESÚS MARÍA CASAL , Portuguesa, Venezuela

La infección por *Helicobacter Pylori* afecta aproximadamente el 50% de la población mundial, presenta una baja frecuencia relativa, en países desarrollados, y una alta frecuencia en países en desarrollo, es por esto, que realizamos el siguiente trabajo de investigación que lleva como Objetivo: determinar la efectividad de la terapia cuadruple con subsalicilato de bismuto en la erradicación de *Helicobacter Pylori* en pacientes que acuden a consulta de gastroenterología en período de enero a julio 2020. Métodos: El presente trabajo fue una investigación de tipo descriptiva y prospectiva, con una muestra representada por 50 pacientes que acudieron a dicha consulta el HCU "Dr. Jesús María Casal Ramos", presentado *Helicobacter Pylori* positivo, a los que se les indicó tratamiento con la terapia cuadruple con subsalicilato de bismuto por 14 días consecutivos. A las 4 semanas, una vez culminada la medicación se ordenó detección cualitativa de antígeno fecal para *Helicobacter Pylori*. Los resultados arrojaron que predominó el sexo femenino en relación al masculino, con un porcentaje de 68% frente al 32%. El promedio de edad fue de 39,4 años, el 100% de los pacientes obtuvo la desaparición de los síntomas una vez culminada la terapia cuadruple con subsalicilato de bismuto. La adherencia al tratamiento fue de 98%, la tasa de erradicación de la bacteria fue del 98% con un OR de 15,6 y una fuerte asociación estadística lo cual demuestra su efectividad. Concluyendo que la terapia cuadruple con subsalicilato de bismuto, resulta efectiva como tratamiento de primera línea.